

山苦荬

ཅ་མཁྲིས།

Shankumai

杂赤

IXERIS HERBA

【处方用名】 山苦荬、苦卖菜。

【来源】 本品为菊科植物山苦荬 *Ixeris chinensis* (Thunb.) Nakai 的干燥全草。花期采集，洗去泥土，阴干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，切段，即得。

【性状】 本品为不规则的段。黄棕色，具纵皱纹和残留的须根，质脆，易折，断面黄绿色。茎自基部多分枝，圆柱形，无毛，断面中央具髓。叶多着生于基部，大多皱缩或破碎，完整者展开后呈条状披针形或篦状披针形，边缘具疏羽状齿。花淡紫色或黄白色，舌片先端齿裂。冠毛白色。气微，味苦。

【鉴别】 粉末灰绿色。茎表皮细胞，长方形或多角形，壁薄，直径 16~18 μ m；木纤维众多，成束或单个离散，长 160 μ m，具斜纹孔；叶表皮细胞，淡黄色，呈多角形或类长圆形，壁薄，气孔不定式，副卫细胞 3~4 个；花粉粒淡黄色，呈圆形，直径 20~24 μ m，外壁较厚，表面有尖刺；梯纹导管，直径 8~18 μ m；草酸钙结晶，形状不一，直径约 14 μ m。

【性味】 味苦，化后味苦；性凉。

【功能与主治】 清热利胆。用于黄疸型肝炎，胆囊炎以及脉病。

【用法与用量】 配方用。

【贮藏】 置干燥处。