

飞廉
Feilian
ཧྲུང་ཆོར་ནག་པོ།
江才尔那布

CARDUI CRISPI RADIX

【处方用名】 飞廉。

【来源】 本品为菊科植物飞廉 *Carduus crispus* L.的干燥带根幼苗。春季采挖，洗净泥土，晒干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，切段，即得。

【性状】 本品为不规则段。茎圆柱形；表面灰褐色或灰黄色，具纵棱，附有黄绿色的叶状翅，翅具针刺。质脆，断面白色，髓部常呈空洞。叶皱缩破碎。根圆柱形，表面棕褐色至灰白色，有不规则的纵皱纹，具须根脱落后的疤痕，质脆，断面灰白色，中心有时呈褐黄色至黑褐色，易见大小不一的不规则间隙。气微，味苦。

【鉴别】 (1)本品粉末浅灰色。非腺毛多碎断，由5~10余个细胞组成，顶端细胞极细长并呈扭曲状。叶碎片上表皮细胞类多角形，垂周壁平直；上、下表皮均具气孔和毛茸。茎表皮细胞长方形、长多角形，垂周壁平直，细胞中有草酸钙晶体及较密的气孔，且具毛茸。

(2)取本品粗粉1g，加乙醇5ml于热水浴上浸2小时，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇0.5ml溶解作为供试品。分别取绿原酸、芦丁制成每1ml含1mg的乙醇溶液，照薄层色谱法（中国药典通则0502）试验，分别吸取上述三种溶液各5μl点于同一羧甲基纤维素钠硅胶G薄层板上，以正丁醇-冰乙酸-水(3:1:1)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下观察，供试品色谱中，在与绿原酸对照品色谱相应的位置上显相同的蓝色荧光斑点；然后再喷以5%三氯化铝乙醇试液在与芦丁对照品色谱相应的位置上显相同的黄色荧光斑点。

【性味】 味甘、涩，化后味甘；性温。

【功能与主治】 催吐。用于消化不良，培根病，疮疖，痈疽等症。

【用法与用量】 配方用。

【贮藏】 置干燥处。