

炒鹿茸

ཤ་བའི་འཕྲོག་རྩ།

Chaolurong

夏贝保拉

CERVI CORNU PANTOTRICHUM

【处方用名】 炒鹿茸。

【来源】 本品为鹿科动物梅花鹿 *Cervus nippon* Temminck 或马鹿 *Cervus elaphus* Linnaeus 的雄鹿未骨化密生茸毛的幼角。

【炮制】 取鹿茸片，除去杂质，置锅中微炒，放凉，即得。

【性状】 呈黄白色至棕红色片状。类圆形或不规则形，外周棕褐色，内部灰白色至棕红色，蜂窝状，体轻，质脆。气微腥，味微咸。

【鉴别】 本品粉末淡黄棕色或黄棕色。表皮角质层细胞淡黄色至黄棕色，表面颗粒状，凹凸不平。毛茸多碎断，表面由薄而透明的扁平细胞（鳞片）作覆瓦状排列的毛小皮所包围，呈短刺状突起，隐约可见细纵直纹；皮质有棕色或灰棕色色素；毛根常与毛囊相连，基部膨大作撕裂状。骨碎片呈不规则形，淡黄色或淡灰色，表面有细密的纵向纹理及点状孔隙；骨陷窝较多，类圆形或类梭形，边缘凹凸不平。未骨化骨组织近无色，边缘不整齐，具多数不规则的块状突起物，其间隐约可见条纹。角化梭形细胞多散在，呈类长圆形，略扁，侧面观梭形，无色或淡黄色，具折光性。

【性味】 味甘、咸，化后味甘；性温。

【功能与主治】 补血、温肾、养精、滋养骨膜，用于治疗气血不足、肾寒、性功能减退、体虚。

【用法与用量】 配方用。

【贮藏】 置干燥处。