

扁刺蔷薇

མེ་ལ།

Bianciqiangwei

色瓦

ROSAE SWEGINZOWAE FRUCTUS

【处方用名】 扁刺蔷薇、扁刺蔷薇皮、扁刺蔷薇果。

【来源】 本品为蔷薇科植物扁刺蔷薇 *Rosa sweginzowii* Koehne 的茎皮及干燥成熟果实。5~6 月采割茎枝，剥取茎皮，晒干。9~10 月采收成熟果实，晒干。

【炮制】 扁刺蔷薇皮 取原药材，除去杂质，切段，即得。

扁刺蔷薇果 取原药材，除去杂质，即得。

【饮片性状】 扁刺蔷薇皮 本品呈长短不一的段。茎呈筒状、槽状或不规则片状。表皮外表面呈灰黄色，具突起的黑腺点和短的锐刺以及刺落后的疤痕，且表面多呈剥离状或脱落，露出红棕色的木栓层；内表面灰白色，近光滑。质脆，易折断，断面平坦。气弱，味微涩。

扁刺蔷薇果 呈长圆形或倒卵状长圆形。顶端宿存花柱基痕，并呈叶状向果实两侧延伸，萼片与果皮部分贴生，外表面灰棕或红棕色，外被刺状刚毛，其无片包裹的面刺少而短，且色浅。气微弱，味淡。

【性味】 味甘，化后味甘；性寒。

【功能与主治】 解毒，退烧，敛黄水。用于中毒性发烧，肝热证，肾病，关节积液等病证。

【用法与用量】 配方用。

【贮藏】 置干燥处。