

矮紫堇

ཇེ་སྒྲོན།

Aizijin

日官

CORYDALIS HERBA

【处方用名】 矮紫堇。

【来源】 本品为罂粟科植物矮紫堇 *Corydalis hendersonii* Hemsl.和扁柄黄堇 *Corydalis mucronifera* Maxim.的干燥全草，夏季连根挖起，洗净，阴干。

【炮制】 取原药材，除去杂质，切段，即得。

【性状】 矮紫堇：本品为不规则的段。根表面棕红色，棕黄色或暗褐红色，顶端常存有干枯或破碎的叶及茎的残基，根上部有细密而略突起的环纹，下部有纵沟纹；质脆易折断；折断面橙红色，中心黄色；无臭，味苦微酸。叶多皱缩破碎，暗绿色或黄绿色，完整的叶湿润展开呈二回或一回三出羽状分裂，茎部叶柄呈鞘状。花少见。蒴果长圆形，表面紫红或黄红色，有明显的纵纹，气微，味苦。

扁柄黄堇：本品为不规则的段。外表黄棕色至红棕色，有明显的纵纹及点状突起的侧根痕，质硬，易折断，断面平整，外围灰黄色，有散在小孔，内部桔黄色，中心灰黄色，紧缩呈圆形，根头部膨大，具棕黄色叶柄残基。叶片破碎萎缩，完整者湿展后可见基生叶具长而扁的叶柄，叶轮廓三角形，羽状细裂，密被白色的膜质皱折。花黄色细弱；苞片倒长卵形，先端细裂成线状，具尖头，被毛；外轮花瓣基部呈囊状，内轮花瓣具鸡冠状突起；果实宽卵形，种子圆肾形，黑褐色有光泽。气微，味极苦。

【鉴别】 矮紫堇：粉末棕黄色。淀粉粒众多，单粒呈类圆形或椭圆形，直径3~10 μ m，可见飞鸟状点状脐点，复粒由2~5分粒组成。导管网纹，直径15~30 μ m。

扁柄黄堇：粉末浅黄棕色。花粉粒类圆球形，表面近光滑，内含颗粒状物质，直径28 μ m，萌发沟3条。花瓣顶端薄壁细胞分化成不规则的绒毛状，常见花粉粒附着。单细胞非腺毛易见，基部微膨大，胞壁略厚，表面光滑，长115~360 μ m，直径12~20 μ m。叶表皮碎片细胞多角形，壁稍厚，常见大形环状、半环状、月牙形的毛疤痕，沿壁有晶体排列，副卫细胞多为5个。淀粉粒细小，单粒，卵圆形，脐点易见，多为“一”字形，层纹不清，直径3~8 μ m。导管螺旋纹、网纹，直径25~78 μ m。草酸钙晶体众多，方晶直径14~58 μ m，砂晶5~17 μ m。

【性味】 味苦，化后味苦；性凉。

【功能与主治】 清热消炎。用于高山多血症，溃疡疼痛，脉管炎，肠炎。

【用法与用量】 配方用。

【贮藏】 置干燥处。